


SANGRADO

SURCO DE LA VENA YUGULAR / LECHONES LACTANTES O LECHONES DESTETADOS

1. ABRIR APLICACIÓN DE LA CÁMARA
2. USE EL CÓDIGO QR
3. PULSE PARA VER VIDEO



CONSIDERACIONES:

- ASEGÚRESE DE USAR EL TIPO CORRECTO DE TUBO PARA SACAR SANGRE. CONSULTE CON SU VETERINARIO PARA DETERMINAR CUÁL ES EL TUBO MÁS APROPIADO.
- CUANDO USE JERINGA, TIRE HACIA ATRÁS EL ÉMBOLO PARA ROMPER EL SELLO ANTES DE PINCHAR LA PIEL.
- CUANDO USE UN VACUTAINER™, PRIMERO PINCHE LA PIEL CON LA AGUJA ANTES DE EMPUJAR EL TUBO EN EL CONECTOR DE LA AGUJA.
- SI UTILIZA EL VACUTAINER™ Y SE PIERDE EL VACÍO EN EL TUBO, USE UN NUEVO TUBO O LLENE EL TUBO CON AGUJA Y JERINGA.
- NUNCA SE DEBE ENDEREZAR UNA AGUJA DOBLADA, REMPLAZAR CON UNA NUEVA.
- PARA SU SEGURIDAD, CUANDO ESTÉ SACANDO SANGRE, PRESTE ATENCIÓN EN LOS CORRALES, POR POSIBLES ANIMALES CURIOSOS O AGRESIVOS.
- USE EQUIPO PERSONAL DE PROTECCIÓN.
- SIEMPRE UTILICE INSTRUMENTAL LIMPIO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN.
- ETIQUETE LAS MUESTRAS CON MARCADOR PERMANENTE.

MATERIALES:

- TUBOS PARA SACAR SANGRE
- JERINGAS (O CONECTOR VACUTAINER™)
- AGUJAS:

EDAD	CALIBRE
LACTANTES	20 x 3/4" or 1"
DESTETADOS	16 or 18 x 1.5"

SUJECCIÓN DEL ANIMAL: (1.º PERSONA)


VER INSTRUCCIONES DE SUJECCIÓN DEL LECHÓN PARA EL SANGRADO, EN LA PÁGINA DE SUJECCIÓN

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE:

(2.º PERSONA)


PASO 1.

LA PERSONA QUE SACA LA SANGRE, DEBE USAR LA MANO LIBRE PARA EXTENDER EL CUELLO SUAVEMENTE, PRESTAR ATENCIÓN DE NO DIFICULTAR LA RESPIRACIÓN.




PASO 2.

SACAR SANGRE DEL SURCO YUGULAR DEL LADO DERECHO DEL LECHÓN.




PASO 3.

ASEGÚRESE QUE LA AGUJA ESTÉ PERPENDICULAR A LA PIEL. LA PARTE MÁS PROFUNDA DEL SURCO YUGULAR ES EL PUNTO DE ENTRADA.




PASO 4.

AJUSTE EL ÁNGULO Y LA PROFUNDIDAD DE LA AGUJA HASTA QUE LA SANGRE FLUYA. PARA REPOSICIONAR, RETIRE HACIA ATRÁS, AJUSTE EL ÁNGULO, AUMENTE O DISMINUYA LA PROFUNDIDAD.




PASO 5.

CUANDO LA SANGRE FLUYA, COLECTE AL MENOS 2 ML. PONER ATENCIÓN PARA LA PRÓXIMA VEZ, EN LA POSICIÓN Y PROFUNDIDAD DE LA AGUJA, ANTES DE REMOVERLA.



PASO 6.

TRANSFIERA LA SANGRE DE LA JERINGA AL TUBO. OBSERVE LOS ANIMALES EN EL CORRAL AL FINALIZAR LA TOMA DE MUESTRA DE SANGRE, PARA DETECTAR CUALQUIER ACTITUD ANORMAL DE LOS LECHONES. ENFRÍE RÁPIDAMENTE LAS MUESTRAS PARA SU ENVÍO.



INSTRUCCIONES DE ENVÍO:

PARA INSTRUCCIONES DE ENVÍO VER A LA PÁGINA DE ENVÍO DE MUESTRAS.

COLABORADORES:

Iowa State University, Swine Medicine Education Center;
Iowa State University, Center For Food Security and Public Health;
American Association of Swine Veterinarians; National Pork Board
Multistate Partnership for Security in Agriculture; United States Department of Agriculture

FINANCIAMIENTO:

Este proyecto fue financiado por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA, a través del Programa Nacional de Preparación de Enfermedades Animales y Respuesta.

ILUSTRACIONES:

Mary Breuer
Swine Medicine Education Center
Iowa State University